

УДК 519.711.7

ББК 22.18

ЗАДАЧА МАРШРУТИЗАЦИИ С РАЗДЕЛЯЕМЫМ ТРАФИКОМ И НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Юлия В. Чуйко*

Учреждение Российской академии наук

Институт прикладных математических исследований

Карельского научного центра РАН

Петрозаводск

e-mail: julia@krc.karelia.ru

Работа посвящена исследованию равновесий в байесовской игре оптимальной маршрутизации, в которой игроки действуют эгоистично, стараясь минимизировать ожидаемую задержку своего трафика. Подобная схема для задачи с неделимым трафиком была представлена в работе [1], здесь предлагается ее модификация для модели сети параллельных каналов, где трафик произвольно разделяемый. Рассматриваются два вида равновесия: равновесие по Вардропу, которое всегда существует и может быть найдено с использованием потенциала, и его частный случай – байесовское равновесие по Вардропу, структура которого представляется более понятной игроку, однако, его существование в данный момент является открытым вопросом.

Ключевые слова: оптимальная маршрутизация, разделяемый трафик, неполная информация, равновесие по Вардропу.

©2009 Ю.В. Чуйко

* Работа поддержана Отделением математических наук РАН по программе «Математические и алгоритмические проблемы новых информационных систем»

1. Модель

Рассмотрим игру $\Gamma = \langle n, m, f, T, p, w \rangle$ с n игроками, m параллельными каналами, функциями задержки трафика $f_{ie}(x) = a_{ie}x$, зависящими от мощностей каналов, определенных для каждого игрока. Для каждого игрока определен набор типов отправляемого трафика T_i и задано совместное распределение $p(t_1, \dots, t_n)$ этих типов. Трафик каждого типа t для игрока i характеризуется своим объемом $w_i(t)$. В данной модели каждый игрок i знает только тип t_i своего трафика, который он собирается отправить, и не знает, какой трафик посылают остальные игроки. Однако, используя известное ему совместное распределение типов трафика, он может найти условное распределение типов трафика, отправляемого остальными игроками, когда сам он посылает трафик типа t_i : $p(t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n | t_i = t) = \frac{p(t_1, \dots, t_i, \dots, t_n)}{p(i, t)}$, где $p(i, t) = \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_i = t} p(t_1, \dots, t_n)$ – вероятность, что игрок i отправляет трафик типа t .

Профилями стратегий в данной игре являются $x = \{x_i^{te}\}_{i \in [n], t \in T_i, e \in [m]}$ где x_i^{te} – трафик типа t игрока i , который он отправляет по каналу e . Компоненты профиля стратегий должны быть неотрицательными и такими, что $\sum_{e \in [m]} x_i^{te} = w_i(t)$. X – множество допустимых профилей x в игре Γ .

Ожидаемая загрузка канала e может быть найдена как $\delta_e(x, p) = \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T} p(t_1, \dots, t_n) \sum_{i \in [n]} x_i^{t_i e}$, и ожидаемые затраты, как $PC_i(x, p) = \max_{e \in [m]: \exists t \in T_i: x_i^{te} > 0} f_{ie}(\delta_e(x, p))$.

Каждый игрок i знает тип трафика, который он посылает. Его целью может быть оптимизация затрат для каждого посылаемого им типа трафика в отдельности. В этом случае рассматривается условная функция ожидаемых затрат, зависящая от условной ожидаемой загрузки каналов сети, которая для каждого канала e имеет вид $\delta_e(x, (p|t_i = t)) = \delta_e^{-i}(x, (p|t_i = t)) + x_i^{t_i e}$, где $\delta_e^{-i}(x, (p|t_i = t)) = \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_i = t} p(t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n | t_i = t) \sum_{i \in [n] \setminus \{i\}} x_i^{t_i e}$ – это условная ожидаемая загрузка канала трафиком всех игроков, кроме i .

Таким образом, условные ожидаемые затраты для игрока i , посылающего трафик типа t , имеют вид

$v_{(i,t)}(x, p) = \max_{e \in [m]: x_i^{t_i e} > 0} f_{ie}(\delta_e(x, (p|t_i = t)))$ и его байесовские ожидаемые затраты определим как $BPC_i(x, p) = \sum_{t \in T_i} p(i, t) v_{(i,t)}(x, p)$. Заметим, что каждое слагаемое в данной сумме не зависит от типов трафика других игроков, кроме i .

Найдем, как связаны между собой ожидаемая загрузка канала и условная ожидаемая загрузка канала.

$$\begin{aligned} \delta_e(x, p) &= \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T} p(t_1, \dots, t_n) \sum_{i \in [n]} x_i^{t_i e} \\ &= \sum_{t \in T_k} \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_k = t} p(t_1, \dots, t_n) \sum_{i \in [n]} x_i^{t_i e} \\ &= \sum_{t \in T_k} p(k, t) \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_k = t} p(t_1, \dots, t_{k-1}, t_{k+1}, \dots, t_n | t_k = t) \cdot \\ &\quad \left(\sum_{i \in [n] \setminus \{k\}} x_i^{t_i e} + x_k^{t_e} \right). \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_k = t} p(t_1, \dots, t_{k-1}, t_{k+1}, \dots, t_n | t_k = t) &= \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_k = t} \frac{p(t_1, \dots, t_{k-1}, t_{k+1}, \dots, t_n)}{p(k, t)} \\ &= \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_k = t} \frac{p(t_1, \dots, t_n)}{p(k, t)} = 1. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \delta_e(x, p) &= \sum_{t \in T_k} p(k, t) \cdot \\ &\quad \cdot \left(\sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T: t_k = t} p(t_1, \dots, t_{k-1}, t_{k+1}, \dots, t_n | t_k = t) \sum_{i \in [n] \setminus \{k\}} x_i^{t_i e} + x_k^{t_e} \right) \\ &= \sum_{t \in T_k} p(k, t) \delta_e(x, (p|t_k = t)). \end{aligned}$$

Найдем общую ожидаемую загрузку сети как суммарную загрузку каналов $\delta_e(x, p)$

$$\begin{aligned} \sum_{e \in [m]} \delta_e(x, p) &= \sum_{e \in [m]} \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T} p(t_1, \dots, t_n) \sum_{i \in [n]} x_i^{t_i e} \\ &= \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T} p(t_1, \dots, t_n) \sum_{i \in [n]} \sum_{e \in [m]} x_i^{t_i e} \\ &= \sum_{(t_1, \dots, t_n) \in T} p(t_1, \dots, t_n) \sum_{i \in [n]} w_i(t_i) =: W. \end{aligned}$$

То есть данная величина является постоянной, обозначим ее W .

Еще одно полезное свойство такого вида загрузки $\delta_e(x, p)$ – вид ее частной производной.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_k^{te}} \delta_e(x, p) &= \frac{\partial}{\partial x_k^{te}} \left(\sum_{t \in T_k} p(k, t) \delta_e(x, (p|t_k = t)) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x_k^{te}} \left(\sum_{t \in T_k} p(k, t) (\delta_e^{-k}(x, (p|t_k = t)) + x_k^{te}) \right) = p(k, t). \end{aligned}$$

2. Равновесия

Определение 2.1. Профиль x в игре Γ называется равновесием по Вардропу, если для каждого игрока $i \in [n]$, любых каналов $e, q \in [m]$, таких, что $x_i^{te} > 0$, выполнено $f_{ie}(\delta_e(x, p)) \leq f_{iq}(\delta_q(x, p))$.

Данная форма определения эквивалентна $PC_i(x, p) \leq PC(x', p)$, где x – равновесие по Вардропу и x' – профиль, получаемый из x , когда кто-то из игроков отклоняется от своей стратегии в x . Равновесие по Вардропу достигается, когда каждый игрок старается минимизировать свои ожидаемые затраты на всех каналах, которые он с ненулевой вероятностью будет использовать хотя бы для одного из возможных типов своего трафика.

Определение 2.2. Профиль x в игре Γ называется байесовским равновесием по Вардропу, если для каждого игрока $i \in [n]$, его трафика типа $t \in T_i$ и каналов $e, q \in [m]$, таких что $x_i^{te} > 0$ выполняется $f_{ie}(\delta_e(x, (p|t_i = t))) \leq f_{iq}(\delta_q(x, (p|t_i = t)))$.

Данная форма определения эквивалентна $BPC_i(x, p) \leq BPC(x', p)$, где x – байесовское равновесие по Вардропу и x' – профиль, получаемый из x , когда кто-то из игроков отклоняется от своей стратегии в x . Байесовское равновесие по Вардропу достигается, когда игроки стараются минимизировать свои байесовские ожидаемые затраты, оптимизируя для себя отправку каждого конкретного типа трафика.

Предложение 2.1. Если x – байесовское равновесие по Вардропу в игре Γ , то $BPC_i(x, p) \leq PC_i(x, p)$.

Доказательство. Пусть x – байесовское равновесие по Вардропу. Тогда для всех $i \in [n]$, $t \in T_i$, $e \in [m]$, таких что $x_i^{te} > 0$, $a_{ie} \delta_e(x, (p|t_k =$

$t)) = \lambda_i^t$, иначе $a_{ie}\delta_e(x, (p|t_k = t)) \geq \lambda_i^t$.

$$\begin{aligned}
 BPC_i(x, p) &= \\
 &= \sum_{t \in T_i} p(i, t) \max_{e \in [m]: x_i^{te} > 0} a_{ie}\delta_e(x, (p|t_k = t)) = \sum_{t \in T_i} p(i, t)\lambda_i^t. \\
 PC_i(x, p) &= \\
 &= \max_{e \in [m]: \exists \tau \in T_i: x_i^{\tau e} > 0} \delta_e(x, p) \\
 &= \max_{e \in [m]: \exists \tau \in T_i: x_i^{\tau e} > 0} \sum_{t \in T_i} p(i, t)a_{ie}\delta_e(x, (p|t_k = t)) \\
 &= \max_{e \in [m]: \exists \tau \in T_i: x_i^{\tau e} > 0} \left(\sum_{t \in T_i: x_i^{te} > 0} p(i, t)\lambda_i^t + \sum_{t \in T_i: x_i^{te} = 0} p(i, t) (\lambda_i^t + \Delta_i^{te}) \right) \\
 &\geq \max_{e \in [m]: \exists \tau \in T_i: x_i^{\tau e} > 0} \left(\sum_{t \in T_i} p(i, t)\lambda_i^t \right) = BPC_i(x, p).
 \end{aligned}$$

□

Определение 2.3. Профиль x в игре Γ – нормальный, если для каждого игрока $i \in [n]$ и каждого канала $e \in [m]$ справедливо: если хотя бы для одного типа трафика $t \in T_i$ выполняется $x_i^{te} > 0$, то $x_i^{\tau e} > 0$ для всех $\tau \in T_i$.

Данное определение означает, что в нормальном профиле игрок использует один и тот же набор каналов для всех типов своего трафика.

Определение 2.4. Байесовское равновесие по Вардропу x в игре Γ называется нормальным байесовским равновесием по Вардропу, если x – нормальный профиль в игре Γ .

Теорема 2.1. В игре Γ любое нормальное байесовское равновесие по Вардропу является частным случаем равновесия по Вардропу, однако могут существовать равновесия по Вардропу, не являющиеся нормальными байесовскими.

Доказательство. Покажем, что нормальное байесовское равновесие по Вардропу является частным случаем равновесия по Вардропу. Если x – байесовское равновесие по Вардропу, то из $x_i^{te} > 0$ следует $a_{ie}\delta_e(x, (p|t_i = t)) \leq a_{iq}\delta_q(x, (p|t_i = t))$, где $e, q \in [m]$. Если x – нормальное байесовское равновесие по Вардропу, то из $x_i^{te} > 0$ следует $x_i^{\tau e} > 0$ для всех $\tau \in T_i$. Таким образом, в нормальном байесовском

равновесии по Вардропу из $x_i^{te} > 0$ мы имеем $a_{ie}\delta_e(x, (p|t_i = \tau)) \leq a_{iq}\delta_q(x, (p|t_i = \tau))$ для всех $\tau \in T_i$, и, следовательно, $a_{ie}\delta_e(x, p) \leq a_{iq}\delta_q(x, p)$.

Пусть теперь x – некоторое равновесие по Вардропу и байесовское равновесие по Вардропу в игре с 2 каналами (быстрым и медленным), 2 игроками, у каждого из которых есть 2 типа трафика для отправки (большого объема и маленького). $a_{11} = a_{21} = 1$, $a_{12} = a_{22} = 1000$. У игроков следующие множества типов трафика: $T_1 = \{1, 2\}$, $T_2 = \{3, 4\}$, где их объемы $w(1) = 1$, $w(2) = 1000$, $w(3) = 1$, $w(4) = 1000$. Совместное распределение выбора типов трафика такое, что $p(1, 4) + p(2, 3) = 1$. Стратегией в равновесии по Вардропу является использование игроками различных каналов, причем для трафика большого объема выбирается наиболее быстрый канал. Очевидно, что такой профиль стратегий не является нормальным байесовским равновесием по Вардропу. \square

Теорема 2.2. *В игре Γ с двумя игроками, у каждого из которых два типа трафика, и двумя каналами, где совместное распределение типов трафика такое, что $p(1, 4) + p(2, 3) = 1$, любое байесовское равновесие по Вардропу – случай равновесия по Вардропу.*

Доказательство. Пусть x – такое байесовское равновесие по Вардропу, которое не является нормальным (если оно нормальное, то очевидно удовлетворяет определению равновесия по Вардропу). Таким образом, хотя бы один из игроков использует разные наборы каналов для разных типов трафика. Пусть это первый игрок, использующий канал 1 для трафика типа 1 и канал 2 для трафика типа 2. Следовательно, для первого игрока

$$\begin{aligned} a_{11}\delta_1(x, (p|t_1 = 1)) &= a_{11}(w_1(1) + x_2^{41}) \leq a_{12}\delta_2(x, (p|t_1 = 1)) = a_{12}x_2^{42}, \\ a_{11}\delta_1(x, (p|t_1 = 2)) &= a_{11}x_2^{31} \geq a_{12}\delta_2(x, (p|t_1 = 2)) = a_{12}(w_1(2) + x_2^{32}), \end{aligned}$$

и для второго игрока

$$\begin{aligned} a_{21}\delta_1(x, (p|t_2 = 4)) &= a_{21}(w_1(1) + x_2^{41}) \geq a_{22}\delta_2(x, (p|t_2 = 4)) = a_{22}x_2^{42}, \\ a_{21}\delta_1(x, (p|t_2 = 3)) &= a_{21}x_2^{31} \leq a_{22}\delta_2(x, (p|t_2 = 3)) = a_{22}(w_1(2) + x_2^{32}). \end{aligned}$$

Заметим, что все части данных неравенств положительны. Обозначая $A = a_{11}$, $B = a_{12}$, $C = a_{21}$, $D = a_{22}$, $a = w_1(1) + x_2^{41}$, $b = x_2^{42}$,

$c = x_2^{31}$, $d = w_1(2) + x_2^{32}$ и применяя Лемму 2.1 получим, что данные неравенства выполняются как равенства. \square

Лемма 2.1. *Для любых положительных A, B, C, D и a, b, c, d из*

$$\begin{aligned} Aa &\leq Bb & Ca &\geq Db \\ Ac &\geq Bd & Cc &\leq Dd \end{aligned}$$

следует

$$\begin{aligned} Aa &= Bb & Ca &= Db \\ Ac &= Bd & Cc &= Dd. \end{aligned}$$

Доказательство. Из первого и второго левых неравенств имеем $\frac{a}{b} \leq \frac{B}{A} \leq \frac{c}{d}$. Из оставшихся получаем $\frac{a}{b} \geq \frac{D}{C} \geq \frac{c}{d}$, что доказывает лемму. \square

Более того, следующая теорема демонстрирует, что даже в общем случае игры Γ байесовское равновесие по Вардропу является равновесием по Вардропу.

Теорема 2.3. *Любое байесовское равновесие по Вардропу в игре Γ является случаем равновесия по Вардропу.*

Доказательство. Пусть x является байесовским равновесием по Вардропу. Тогда для всех $i \in [n]$, $t \in T_i$, $e \in [m]$, таких, что $x_i^{te} > 0$, $a_{ie}\delta_e(x, (p|t_k = t)) = \lambda_i^t$, иначе $a_{ie}\delta_e(x, (p|t_k = t)) \geq \lambda_i^t$. Предположим, что x не равновесие по Вардропу. Тогда существует хотя бы один игрок i , который может, отклонившись от стратегии в x , уменьшить свои ожидаемые затраты $PC_i(x, p)$.

$$\begin{aligned} PC_i(x, p) &= \\ &= \max_{e \in [m]: \exists \tau \in T_i: x_i^{\tau e} > 0} \delta_e(x, p) \\ &= \max_{e \in [m]: \exists \tau \in T_i: x_i^{\tau e} > 0} \sum_{t \in T_i} p(i, t) a_{ie} \delta_e(x, (p|t_k = t)) \\ &= \max_{e \in [m]: \exists \tau \in T_i: x_i^{\tau e} > 0} \left(\sum_{t \in T_i: x_i^{te} > 0} p(i, t) \lambda_i^t + \sum_{t \in T_i: x_i^{te} = 0} p(i, t) (\lambda_i^t + \Delta_i^{te}) \right). \end{aligned}$$

Игрок i не может уменьшить загрузку каналов с задержкой трафика, большей λ_i^t , так как он не использует данные каналы для трафика типа t . Добавление небольшой части трафика с канала e с задержкой λ_i^t на некоторый канал q в любом случае ведет к увеличению

ожидаемых затрат за счет увеличения загрузки канала q . На нем либо уже есть загрузка λ_i^t , если он используется для трафика t в x , либо добавление на него трафика типа t вовлекает в ожидаемые затраты новый канал с загрузкой $\geq \lambda_i^t$. Таким образом, для игрока i нет возможности отклониться, уменьшив свои ожидаемые затраты, и, следовательно, x является равновесием по Вардропу. \square

3. Существование равновесия по Вардропу

Рассмотрим функцию

$$\Psi(x) = \sum_{i \in [n]} \sum_{t \in T_i} \sum_{e \in [m]} p(i, t) x_i^{te} \ln(a_{ie}) + \sum_{e \in [m]} \delta_e(x, p) \ln(\delta_e(x, p)),$$

которая является вероятностной модификацией функции потенциала в работе [2]. Она выпуклая как сумма выпуклых функций, следовательно, для нее существует минимум на выпуклом множестве X .

Теорема 3.1. *Если в игре Γ существует равновесие по Вардропу x , то*

$$\Psi(x) = \min_{y - \text{профиль стратегий в } \Gamma} \Psi(y).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi(x)}{\partial x_i^{te}} &= p(i, t) \ln(a_{ie}) + p(i, t) \ln(\delta_e(x, p)) + p(i, t) \\ &= p(i, t) (\ln(a_{ie} \delta_e(x, p)) + 1). \end{aligned}$$

В равновесии по Вардропу из $x_i^{te} > 0$ следует $a_{ie} \delta_e(x, p) \leq a_{iq} \delta_q(x, p)$ и тогда

$$p(i, t) (\ln(a_{ie} \delta_e(x, p)) + 1) \leq p(i, t) (\ln(a_{iq} \delta_q(x, p)) + 1)$$

и, следовательно,

$$\frac{\partial \Psi(x)}{\partial x_i^{te}} \leq \frac{\partial \Psi(x)}{\partial x_i^{tq}}.$$

Тогда из Леммы в работе [2] $\Psi(x) = \min_{y - \text{профиль стратегий в } \Gamma} \Psi(y)$. \square

Теорема 3.2. *Если профиль x в игре Γ обеспечивает минимум функции $\Psi(x)$, то x является равновесием по Вардропу.*

Доказательство. Из условий Куна-Таккера следует, что x обеспечивает минимум функции $\Psi(x)$ тогда и только тогда, когда существует такое значение λ , что для $i \in [n]$, $t \in T_i$, $e \in [m]$ и

$$L(x, \lambda) = \Psi(x) - \sum_{i \in [n]} \sum_{t \in T_i} \lambda_i^t \left(\sum_{e \in [m]} x_i^{te} - w_i(t) \right)$$

выполняется:

$$\begin{aligned} \text{если } x_i^{te} > 0, \text{ то } \quad & \frac{\partial}{\partial x_i^{te}} L(x, \lambda) = 0, \\ \text{если } x_i^{te} = 0, \text{ то } \quad & \frac{\partial}{\partial x_i^{te}} L(x, \lambda) \geq 0. \end{aligned}$$

Следовательно, обозначив $\alpha_i^t = e^{\left(\frac{\lambda_i^t}{p(i,t)} - 1\right)}$, получаем

$$a_{ie} \delta_e(x, p) = \alpha_i^t \text{ если } x_i^{te} > 0 \text{ и } a_{ie} \delta_e(x, p) \geq \alpha_i^t \text{ если } x_i^{te} = 0.$$

Поскольку $a_{ie} \delta_e(x, p)$ не зависит от типа трафика игрока, то α_i^t равны для всех тех типов трафика игрока i , для которых существует хотя бы один канал, используемый для обоих типов; обозначим их как α_i . Для остальных типов трафика τ их $\alpha_i^\tau \leq \alpha_i$.

С другой стороны трафик типа τ отправляется по некоторому каналу q , где $x_i^{\tau q} > 0$. Если $x_i^{tq} > 0$, то $a_{iq} \delta_q(x, p) = \alpha_i^\tau = \alpha_i^t = \alpha_i$. Если $x_i^{tq} = 0$, то $a_{iq} \delta_q(x, p) = \alpha_i^\tau \geq \alpha_i^t = \alpha_i$. Таким образом, $\alpha_i^\tau = \alpha_i^t = \alpha_i$.

Следовательно, для всех $i \in [n]$, $e \in [m]$, таких что каждый игрок i использует канал e для отправки хотя бы одного типа своего трафика, имеем $a_{ie} \delta_e(x, p) = \alpha_i$, где α_i – некоторые константы. \square

Заметим, что минимум функции $\Psi(x)$ на X существует, отсюда следует справедливость следующей теоремы.

Теорема 3.3. *В игре Γ всегда существует равновесие по Вардропу.*

Заметим, что равновесие по Вардропу в игре Γ может быть не единственным и некоторые равновесия могут быть байесовскими. Это иллюстрируется следующими примерами.

Пример 3.1. Данный пример демонстрирует ситуацию, когда равновесие по Вардропу также является байесовским. Рассмотрим игру

с двумя игроками и двумя каналами с $a_{11} = a_{21} = 1, a_{12} = a_{22} = 2$. Множества типов трафика игроков определены как $T_1 = \{1, 2\}, T_2 = \{3, 4\}$, где $w(1) = 1, w(2) = 25, w(3) = 1, w(4) = 50$. Совместное распределение типов трафика такое, что $p(1, 4) = p(2, 3) = 1/2$.

Стратегии в равновесии по Вардропу:

$$\begin{array}{ll} x_1^{11} = 0 & x_1^{12} = 1 \\ x_1^{21} = 16\frac{1}{3} & x_1^{22} = 8\frac{2}{3} \\ x_2^{31} = 1 & x_2^{32} = 0 \\ x_2^{41} = 34 & x_2^{42} = 16. \end{array}$$

Условные ожидаемые загрузки и ожидаемые загрузки равны для обоих каналов, $\Psi(x) \approx 124.939$.

Пример 3.2. Данный пример демонстрирует равновесие по Вардропу, которое не является байесовским. Рассмотрим игру из предыдущего примера. Следующий профиль также является равновесием по Вардропу:

$$\begin{array}{ll} x_1^{11} = 1 & x_1^{12} = 0 \\ x_1^{21} = 25 & x_1^{22} = 0 \\ x_2^{31} = 1 & x_2^{32} = 0 \\ x_2^{41} = 24\frac{1}{3} & x_2^{42} = 25\frac{2}{3}. \end{array}$$

Ожидаемые загрузки равны для обоих каналов, $\Psi(x) \approx 124.939$, но условные ожидаемые загрузки не соответствуют байесовскому равновесию по Вардропу. Например, для игрока 1:

$$\begin{array}{ll} a_{11}\delta_1(x, (p|t_1 = 1)) = x_1^{11} + x_2^{41} = 25\frac{1}{3} & a_{12}\delta_2(x, (p|t_1 = 1)) = x_1^{12} + x_2^{42} = 51\frac{1}{3} \\ a_{11}\delta_1(x, (p|t_1 = 2)) = x_1^{21} + x_2^{31} = 26 & a_{12}\delta_2(x, (p|t_1 = 2)) = x_1^{22} + x_2^{32} = 0. \end{array}$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gairing M., Monien B., Tiemann K. *Selfish Routing with Incomplete information* // Theory Comput Syst. 2008. P. 91-130.
2. Gairing M., Monien B., Tiemann K. *Routing (Un-) Splittable Flow in Games with Player-Specific Linear Latency Functions* / Proceedings of the 33rd International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP 2006), LNCS 4051, 2006. P. 501-512.

ROUTING PROBLEM WITH SPLITTABLE TRAFFIC AND INCOMPLETE INFORMATION

Julia Chuiko, Institute of Applied Mathematical Research Karelian Research Center of RAS, Petrozavodsk, Cand.Sc. (julia@krc.karelia.ru).

Abstract: We investigate the equilibria in Bayesian routing game in network with selfish users' behavior where each user chooses his route trying to minimize the expected delay of his own traffic he send. This scheme is based on [1] and modified for model with parallel links where user's traffic is splittable. Our interest are equilibria: Wardrop Equilibrium, that always exists and can be found using potential function, and its special case Bayesian Wardrop Equilibrium, that can be more easily understood by users, but its existence is an open question.

Keywords: optimal routing, splittable traffic, incomplete information, Wardrop equilibrium.